



Crítérios de Diagnóstico (2015)

CRITÉRIOS ABSOLUTOS (OBRIGATÓRIOS)

- Neurite Óptica
- Mielite Aguda

CRITÉRIOS DE SUPORTE (PELO MENOS 2)

- Imagiológicos
 - > RM cerebral sem critério para EM
 - > RM medular – lesões verticais extensas a 3 ou + vértebras
- Laboratoriais
 - > Seropositividade para anti-AQP4



Lennon and al, 2004/2005

MAIS DE 350
POSTOS DE COLHEITA

CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL
GERMANO DE SOUSA

Pólo Tecnológico de Lisboa
Rua Cupertino de Miranda, 9 - lote 8
1600-513 Lisboa
Tel: 213 561 066 / Fax: 217 161 676

CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL
GERMANO DE SOUSA, S. A.
Director: Prof. Dr. Germano de Sousa
N.º de licença: 0117 L/2009

Concepção de conteúdos:
Prof. Doutora Maria José Rego de Sousa
(Médica Patologista Clínica)




 **GERMANO DE SOUSA**
CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL



www.germanodesousa.com

Neuromielite Óptica



 **GERMANO DE SOUSA**
CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL

A ciência do pormenor.

Neuromielite Óptica ou Doença de Devic

DOENÇA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA DO SNC

- Neurite óptica grave
- Mielite transversa longitudinal extensa
- Curso recorrente
- Diminuição de visão, da acuidade visual e dos campos de visão
- Eventual cegueira
- Fraqueza muscular
- Redução sensibilidade

- Paraparésia ou quadriparésia espástica
- Perda de controlo dos esfíncteres

O marcador serológico específico da NMO é anti-APQ4

ANTICORPOS ANTI-AQUAPORINA-4 (anti-APQ4)

- Especificidade até cerca de 99%
- Está presente na maioria dos doentes com NMO (61-98%)
- Os títulos acompanham a extensão das lesões
- Um resultado positivo está geralmente presente no início da doença
- Um resultado negativo não exclui o diagnóstico da mesma
- Permitem o diagnóstico diferencial da NMO de mau prognóstico, com EM clássica (entidade separada)

